

Counselling Andrologico



Cause di DE

- PSICHICHE 20-30%
- ORGANICHE 70-80%
 - endocrine 2-3%
 - vascolari 50-60%
 - neurologiche 10-20%

ANAMNESI

- CLINICA
- SESSUALE
- PSICOSOCIALE

- Diagnosi Differenziale fra organica e psicogena

Intervista al paziente in ambiente idoneo
(solo/accompagnato; infermiere/a)

ANAMNESI CLINICA

- IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO

Età

Abitudini voluttuarie (tabagismo, alcool)

Iperensione Arteriosa

Diabete Mellito

Aterosclerosi

Dislipidemie

Chirurgia

Traumi pelvici, perineali

ANAMNESI CLINICA

- IDENTIFICAZIONE FATTORI DI RISCHIO

ASSUNZIONE DI FARMACI

Betabloccanti (Atenololo)

Antagonisti dei recettori H2 (Ranitidina)

Antagonisti dopaminergici (Domperidone, Sulpiride)

Inibitori della sintesi/captazione, depletori delle catecolamine (Metildopa, Reserpina, Imipramine)

Amfetamine Estrogeni Oppiacei Metoclopramide

Ciproeptadina

ANAMNESI SESSUALE

Erezioni notturne

Difficoltà ad ottenere l'erezione

Difficoltà a mantenere l'erezione

Eiaculazione precoce

Deficit di desiderio

Disfunzioni eiaculatorie/dispareunia

Erezione dolorosa

Recurvatum penieno

ANAMNESI PSICOSOCIALE

Partner fissa od occasionale

Qualità affettiva della relazione

Qualità sessuale della relazione

Disponibilità della partner al problema

Qualità ed intensità del desiderio della partner

Frequenza dei rapporti

Ansia dimensionale

IIEF

INTERNATIONAL INDEX OF ERECTIL FUNCTION

Questionario autosomministrato che investiga la disfunzione sessuale maschile approfondendo 5 domini:

Funzione erettile

Funzione orgasmica

Desiderio sessuale

Soddisfazione sessuale

Soddisfazione generale

IIEF-5

INTERNATIONAL INDEX OF ERECTIL FUNCTION

Scheda di Valutazione della Funzione Erettile (IIEF-5)

Nome del paziente _____

Data di valutazione _____

Istruzioni per il paziente

La sessualità è una parte importante del benessere psicofisico globale dell'individuo. La disfunzione erettile è un disturbo sessuale molto comune. Ci sono diverse opzioni terapeutiche disponibili per il trattamento della disfunzione erettile. Il questionario è stato creato per aiutare Lei e il Suo medico a riconoscere se Lei è affetto da disfunzione erettile e a discutere dei trattamenti disponibili.

Ciascuna domanda ha molte risposte tra le quali può scegliere quella che meglio descrive la Sua situazione. Per favore, risponda a tutte le domande tracciando un segno , e scelga sempre una sola risposta.

Negli scorsi 6 mesi

1. La Sua capacità di raggiungere e mantenere l'erezione è stata:

Molto bassa	Bassa	Moderata	Alta	Molto alta
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

2. Dopo la stimolazione sessuale ha raggiunto un'erezione sufficiente per la penetrazione:

Non ho avuto alcuna attività sessuale	Quasi mai/mai	Poche volte molto meno della metà delle volte	Qualche volta circa la metà delle volte	La maggioranza delle volte più della metà delle volte	Quasi sempre/ sempre
0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

3. Durante il rapporto sessuale, è riuscito a mantenere l'erezione dopo la penetrazione:

Non ho tentato di avere rapporti sessuali	Quasi mai/mai	Poche volte molto meno della metà delle volte	Qualche volta circa la metà delle volte	La maggioranza delle volte più della metà delle volte	Quasi sempre/ sempre
0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

4. Durante il rapporto sessuale, mantenere l'erezione fino alla fine del rapporto è stato:

Non ho tentato di avere rapporti sessuali	Estremamente difficile	Molto difficile	Difficile	Abbastanza difficile	Facile
0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

5. Quando ha avuto un rapporto sessuale, ha provato piacere:

Non ho tentato di avere rapporti sessuali	Quasi mai/mai	Poche volte molto meno della metà delle volte	Qualche volta circa la metà delle volte	La maggioranza delle volte più della metà delle volte	Quasi sempre/ sempre
0 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>

Punteggio

Se il punteggio è uguale o inferiore a 21, è probabile che Lei soffre di disfunzione erettile. Sarebbe utile parlarne col Suo medico.

ESAME OBBIETTIVO

Genitali completi

placche calcifiche, prepuzio e frenulo breve, palpazione testicolare, esplorazione rettale

Timbro vocale

Distribuzione peli

Ginecomastia

Edemi

Deficit neurologici

ESAMI EMATOCHIMICI

- **DI BASE**

glicemia

dosaggio lipidico

colesterolemia

- **SPECIFICI**

testosteronemia libera e coniugata

prolattinemia

FSH, LH

