

# Protocollo di terapia medica dell'Induratio Penis Plastica in fase florida



# Ciclo Laser e Iontoforesi

## Laser

due applicazioni di 20 minuti a  $20.00 \text{ j/cm}^2$   
la settimana

## Iontoforesi

Desametasone 4 mg/1ml + Verapamil  
5mg/2ml

una applicazione di 20 minuti a 2 mA per tre  
volte la settimana

Ogni ciclo ha una durata di 12 settimana  
durante le quali vengono eseguite 24  
sedute di laser terapia e 36 applicazioni di  
iontoforesi

efficacia del trattamento nei confronti di

- curvatura
- estensione della lesione
- dolore all'erezione
- qualità dell'attività sessuale

## Curvatura

riduzione significativa 25% dei pazienti

## Estensione della lesione

riduzione 30% dei pazienti

## Dolore all'erezione

riduzione significativa della sintomatologia  
85% dei pazienti

## Qualità dell'attività sessuale

miglioramento 60% dei pazienti

La combinazione di laser e iontoforesi si dimostra particolarmente efficace nelle lesioni in fase florida per quanto riguarda il dolore all'erezione e la qualità dell'attività sessuale correlata

Non sembra essere un trattamento che possa migliorare in modo significativo il grado di curvatura delle lesioni a tal punto da scongiurare la terapia chirurgica quando indicata

